

75. TKA 術中経食道心エコー像の検討

太田秀幸, 土田豊実, 金 泰成  
渡辺英一郎 (千大)

対象は変形性膝関節症の診断でTKAを行った女性3例で、髄内アライメント法を2例に、髄外アライメント法を1例に行った。駆血解除前後の経食道心エコー横断像で、右心房内に embolic echo が全例で観察され、髄内法で多量であった。術中右心房内採血中の脂肪滴は髄外法に多く観察された。生理的食塩水にても echogenic emboli が観察された。今後、echogenic emboli の質的、量的検討が必要である。

76. 児玉・山本式人工膝関節の治療成績

竹内仁煥 (千大)  
篠原寛休, 藤塚光慶, 矢島敏晴  
丹野隆明, 品田良之, 飯田 哲  
早川 徹, 楊 群 (松戸市立)

当院で施行された児玉・山本式人工膝関節の治療成績について報告した。39例55関節のうち、RA34例44関節、OA5例7関節で使用機種はMARKII2関節、MARKIII49関節であった。術後伸展拘縮は3関節、ルースニングは大腿骨側4関節、脛骨側1関節に認められ、移植骨の collapse による再置換を1関節に要した。手術器械が少なく操作が比較的容易である反面、正確なインプラントを設置する際、術者の経験に頼る点が問題である。



■ 効能・効果

- 高血圧症
- 腎実質性高血圧症

禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 1) 本剤に対し、過敏症の既往歴のある患者
- 2) 他のアンジオテンシン変換酵素阻害剤による血管浮腫の既往歴のある患者
- 3) デキストラン硫酸セルロースを用いたLDLアフェレーシス施行中の患者
- 4) アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜(AN69®)を用いた血液透析施行中の患者
- 5) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人  
(「妊婦・授乳婦への投与」の項より要約)

※用法・用量、使用上の注意の詳細等は、製品添付文書をご覧ください。

アンジオテンシン変換選択性阻害剤

薬価基準収載



指要指 **タナトリル錠** 2.5 5 10  
Tanatril® (一般名:塩酸イミダプリル)



〈資料請求先〉  
田辺製薬株式会社  
大阪市中央区道修町3丁目2番10号