

又余輩ノ大ニ疑チ抱クハ從來濕疹ノ治療中ニ發スル腎炎ハ必其際用エル藥物若クハ治法ニ原因ス可キカ或ハ治療ニ關セスシテ發來シ其偶々治療中(第一患者ニ於ケルカ如ク)發スルハ眞ニ偶然ニ相合シタル者ニシテ互ニ因果ヲナシタルニアラサルカノ点ニ在リ第一患者ノ一二回食鹽浴ヲ行ヒテ濕疹ノ頓ニ治療ニ就カントスル際浮腫ヲ認メタルハ疹ノ治癒ニ就キシ爲ニ腎炎ヲ發シタル者ト認ムルヲ得ヌ其所以ハ第一濕疹ノ一二回ノ食鹽浴ニ依リテ癒ユヘキ者ニアラサルハ吾人實地醫家ノ日常經驗ニ徴シテ明カナレハ余輩ハ食鹽浴ノ爲メニ癒エタルニアラスシテ其際已ニ腎炎ヲ越シタルニ依リ疹ノ消退ヲ促カセシ者ト斷定セサルベカラス第二濕疹ノ經過中ニ腎臟炎若クハ他病ヲ發スルニ依リ疹ノ頓ニ消退ニ就クコアルハ一般ニ知ラレタル事實ナレバ疹ノ消退ニ依リテ腎炎ヲ發シタルヤ腎炎ノ發シタルニ依リ疹ノ消退シタルヤ容易ニ斷定シ難シ第三濕疹ニ施治スルコトハ果シテ腎炎ヲ誘發スルコト因コナルモノナレハ濕疹ニ腎炎ノ發來スルコト尙一層多カル可

キ筈ナリ然ルニ夥多ノ濕疹(殊ニ疥癬濕疹)ニ種々ノ療法ヲ施シ比較的稀ニ腎炎ヲ發スルヲ以テ見レハ其發スルハ皮疹其者ニ因スルヤ若クハ治療ニ因ス可キヤ是亦容易ニ斷定シ難シ之ヲ要スルニ上文記スル處ノ疑問ハ實地醫家ニ緊要ナルハ論ヲ待タヌ之カ明解ヲ勉ムルハ吾人醫家ノ宜シク從事スヘキ業ナリト信スルヲ以テ少ナシト雖モ茲ニ二經驗ヲ報シ之ニ依リテ此ノ不緊要ナラサル疑問ニ向ヒ醫家ノ注意ヲ惹クコトヲ得レハ余輩ノ幸亦甚タシ

◎鑑定書(母体内ニ於テ死亡セル胎兒)

其二 會員 森 理 記

左ノ一篇ハ余ガ數年以前實驗セル所ニシテ其記載甚タ不完全ナリト雖モ前號ニ於ケル嬰兒殺ト對比セシガ爲メ餘白ヲ汚スコトナシヌ又タ次ノ一節ハ參考ノ爲メ某成書中ヨリ抄録セルモノナリ讀者諒焉

母体内ニ於テ死亡セル胎兒ノ徵候ハ其自然の原由ニテ死亡セルモノハ直ニ分娩セズシテ却テ母体内ニ若

千ノ時日ヲ費スガ故ニ多少腐敗ノ状態ヲ以テ出産スルモノナリ此ノ如キ尸屍ヲ鑑定スルニ當リ其尸屍腐敗ノ爲メニ變化セラレザルキハ容易ニ其原因ヲ知ラスベシ若シ尸屍數日或ハ數週母体内ニ住ル時ハ尸屍ハ一般ニ彈力ヲ失シ諸關節弛緩シ表皮ノ大部分剝離シ居ル歟或ハ容易ニ剝離スベク而シテ眞皮ハ汚帶褐赤色ニ浸淫セラレ其浸淫ハ体ノ大部分若クハ一般ニ存在ス殊ニ不熟ノ胎兒ニ於テ甚シ皮膚ハ滋潤シ頭部ハ扁平ニ壓迫セラレ頭皮袋ノ如ク弛緩シ其弛緩セル皮上ヨリ縫合ノ解綻セル頭蓋骨ヲ觸知シ得ベシ眼球結膜ハ血液様ニ浸潤セラレ頸部ハ袋ノ如ク弛緩シ下腹側方ニ垂下シテ「シワッペン」(太ぶく)トナリ臍帶ハ血液或ハ胆汁ノ爲メニ浸潤セラレ

剖驗スルニ諸々ノ軟部軟骨ニ至ルマデ血液様ニ浸潤セラレ而シテ一般ニ汚帶褐赤色トナリ總テノ漿液囊内ニハ血液様漿液性ノ滲出物アリ殊ニ肋膜及ヒ腹腔内存在スルヲ見ル肺ハ空氣ヲ含マズキトシテハ胎内

ニ於テ呼吸ヲ營爲シ窒死セシガ爲メニ肋膜ニ出血ヲ來スシ或ハ心囊内ニモ之ヲ見ルコトアリ此場合ニ於テハ氣道内ニ羊水ヲ含有ス但シ此羊水ハ死后ニモ入ルコトヲ得ルモノナリ死後分娩早キニ從テ此等ノ現象少ナク若シ死后直ニ分娩スルキハ眞ノ死産ナル歟或ハ分娩ノ際死亡セシカ區別スルコト多クハ成シ難キモノナリ

頭蓋腫存スルモ尙ホ分娩ノ際マデ生活セシモノト診斷ナシ難シ何トナレバ死体ニモ亦タ頭皮ノ浸潤ノ爲メニ(沈澱及ヒ死后ノ滲出)屢々暫時ニシテ發起スルコトアレバナリ

母体ニ於テ死亡セル胎兒ハ通例胎盤ト共ニ分娩スルモノナリ「マチェリーレン」通帯腐敗ト譯スルモ實ハ水ニ浸サレテ變質セシトノ義ノ爲メニ發セシ前述ノ變化ヲ已往ノ人ハ病的變狀ト看做ヒシヲ以テ胎兒ノ血液様水腫ト名ケタリ又タ頭蓋骨ノ弛緩ヲ挫傷ト誤認シ先天性天疱ノ存スルヲ腐敗ニ因スルモノト看做セシコトアリ眞ノ腐敗ハ卵膜ノ中ニ

(論 說)

鑑定書(母体内ニ於テ死亡セル胎兒)

テハ發起(十分)セス若シ「マチエリーレン」ノ胎兒ガ
子宮或ハ腹腔ニ數月間止マルルハ血液ハ滲透機能及
ヒ浸油機能ニヨリテ体外ニ出テ胎兒ハ全ク蒼白色ト
ナリテ脂肪様ノ外貌ヲ呈ハス爲メニ脂肪様變生ノ名
アリ(以下略之)

某郡某村某番地平民某妻某女ガ謀殺被告事件ニ付キ千葉
輕罪裁判所豫審判事補某同裁判所書記某ト共ニ明治二十
年四月六日午后零時三十分右某ガ家宅ニ臨就シ某女ガ婉
出セル兒屍ニ就キ該致命ノ原因ヲ鑑定スルコ次ノ如シ

第一 現場所見

右某ノ家宅ハ里道ヨリ拾餘間西南ノ方ヘ入りシ裏家ニシ
テ該屋ノ南隅ヨリ四間餘ヲ距テ西北ニ向キタル矮小ノ廁
園アリ某女ハ廁ノ直后ニ至リ兒屍ヲ此處ニ埋没セシ旨指
示セルニ依リ鍬ヲ以テ徐々之レヲ發掘スルニ其地質ハ貝
殼ヲ混セル砂地ニシテ地盤ヨリ大約二十六仙迷ノ處ニ至
リ古キ華筵ヲ以テ包ミ其兩端ヲ藁繩ニテ縛シ恰モ苞狀ヲ
ナセル一塊ヲ認ム依テ其原位ヲ損セザル様注意シツ、古

箱上ニ載セ且ツ同處ハ狹隘ニシテ檢査ニ不便ナルヲ以テ之
レヲ同家ノ簷下ニ移セリ

第二 屍体外表所見

第一條 古箱上ノ苞狀物ハ長サ七十五仙迷ニシテ其中央
最モ大ナル部ニ於テ幅厚サ各拾六仙迷兩端ニ近クニ從
ヒ漸次狹小トナリ而シテ少ク臭氣ヲ放ツ先ツ外套ノ華筵
ヲ開クニ中ニ襪縷アリ之レヲ解クニ數層ニシテ始メテ兒
屍ノ露出スルヲ見ル但シ該襪縷ハ密ニ屍体ニ固着セル
ヲ以テ之レヲ除去スルニ甚タ困難ナリキ

第二條 屍体ハ仰臥ノ位ヲ取り顔面ヲ右方ニ傾ケ左上肢
ハ前方ニ屈曲シテ手ヲ右乳房下ニ接シ右上肢ハ上方ニ
屈曲シテ手首右前額ニ達セリ左右下肢共ニ膝關節ニ於
テ内方ニ屈曲シテ足部少シシテ交叉シテ殆ント踞坐ノ狀ヲ
呈セリ而シテ全身ノ皮膚ハ概シテ帶藍暗紅色ニシテ其表皮ハ
剝離シ易ク且ツ黃白色乾酪様物(兒垢)ノ點々附着スル
ヲ見ル死後強直ハ已ニ去レリ

第三條 屍体ハ男性ニシテ營養不良身體羸毛ヲ以テ被ハ

レ、殊ニ肩胛及ヒ上膊部ニ著シ身長四十二仙迷体重一八九〇瓦謨ヲ算ス

第四條 頭部 頭蓋ノ皮膚ハ囊狀ニ弛緩シ頭蓋骨ノ各縫合ハ交互相離開シ而シテ左顳顬骨ノ上縁同側顳頂骨下ニ陷没スルヲ以テ頭首ハ左右ノ直徑減縮シ前後ノ直徑著ク延長ス后頭部ハ甚シク柔軟ニシテ恰モ流動体ヲ盛ルモノニ似タリ而シテ頭髪ハ最長部ニ於テ二仙迷ノ長サヲ有ス

第五條 顔面 (イ) 眼ハ左右共ニ半開シ眼瞼壓平セラレ之レガ爲メ角膜ハ上下眼瞼間ニ箝入シ又々瞳孔膜ヲ見ズ眼瞼結膜ハ暗紅色ヲ呈シ前房中血液様物ノ浸潤ヲ見ル(ロ)鼻ハ壓平セラレ爲メニ右側ノ鼻孔ハ全ク鎖閉ス鼻軟骨ハ觸知シ難シ(ハ)口ハ之レヲ開クコト半仙迷口唇ハ帶褐黑色ニシテ乾燥シ口内粘膜炎淡紅灰白色ニシテ舌ハ齒床突起ノ内ニ在リ而シテ口内異物ヲ認メス(ニ)耳ハ左右共ニ壓平セララル殊ニ右側即チ下部ニ於テ著シ耳軟骨ハ觸知セズ

第六條 頸部 前頸部ヨリ胸骨把柄部ヘカケ上下直徑四仙迷左右横徑六仙迷ノ帶藍赤色ナル囊狀ノ腫起ヲ見ル 后頸部異狀ナシ

第七條 胸部 之レヲ打診スルニ濁音ヲ放ツ

第八條 腹部 腹壁少ク弛緩ス臍帶ハ其長サ九仙迷ニシテ切離セリ但シ結紮ナシ

第九條 背部 第五腰椎ノ漸ヤ右側ニ於テ直徑二仙迷ノ殆ント正圓形ニシテ銳縁ナル表皮剝脫部アリ暗赤色ヲ呈シ其周圍ハ少ク隆起シ觸試スルニ微ニ硬結ヲ覺ユ

第十條 生殖器 陰莖ハ其尖端潰亂シテ目視シ難ク陰囊ハ暗紫色ニ膨大シ内ヘ墨丸ヲ有セズ

第十一條 肛門ハ僅カニ哆開スルモ胎兒便ノ附着ヲ見ズ

第十二條 上肢 右肩胛ノ上部ニ長サ二仙迷半幅一仙迷ノ水泡アリ左腕關節ハ前分ニ脱臼シ能ク前膊骨ノ下端ヲ觸知スベシ而シテ爪甲ハ殆ンド將サニ指尖ニ達セントス

第十三條 下肢 左右足背共ニ水泡ヲ呈ス而シテ左足跟骨

骸子骨關節離開シ爲メニ趾尖ノ外側能ク下腿ノ前面ニ
接スルヲ得ベシ (未完)

◎十二指腸虫病ニ就テ

會 員 中村彌一郎

十二指腸虫 *Ankylostoma duodenale* ハ千八百三十八年伊
太利亞國ミラン府ニ於テズビニー Dubini 氏ノ發見ニ係
リ次テピルハルツ Pillula 氏ハ埃及國ニ於テ發見セリ千
八百五十一年グリーシンゲル Griesinger 氏ハ本虫ノ埃及
萎黃病ノ原因タルヲ認メウツヒヤレル Wucherer 氏ハ
ラツリヤ國ニ於テ高度ノ貧血患者ノ糞便中ニ本虫ヲ發見
セシ爾來世人大ニ本虫ニツキ注意スルニ到レリ就中研究
シタル者ハ伊太利亞國ノ諸醫ナリトス
近來ニ到テハ各國ニ於テ本虫ヲ發見セシ即獨逸瑞西ザル
シニヤ、佛蘭西、ウングロン、荷蘭、白耳義等ノ諸國之レナリ
特ニ有名ナルハ千八百八十年ゴットハルトノ隧道工事中
伊太利亞國ノ勞夫本虫ノ寄生スル處トナリヘエロンナト

一、コンカート Peronato Conkath 二氏之レカ發見ヲナセ
シコ之レナリ故ニ本虫寄生ニ因スル貧血者ヲ目ノ隧道貧
血 Thanaemia ト云フ又ヘエロンナト一氏ハザルザニ
アノ鑛山及ヒ南佛蘭西ノコンメトリイ等ニ於テノ鑛夫ニ
來ル貧血病ハ多クハ本虫ニ因スルコトヲ知リ鑛山惡液症ノ
Bergwerks Cakexil 名ヲ附セリ爾后フランコツトマシユ
ース Flankott Maschus 二氏ハ千八百八十四年リユーリ
ッヒノ近傍ニ在ル炭坑々夫ニ之ヲ見マイエル及ビメンヘ
二氏 Meier. Menhe ハアーヘン近傍ノ坑夫ニ之ヲ見タリ
ト云フ
又歐洲ニ於テハ煉瓦職工ノ濕潤セル粘土中ニ勞役セル者
ニ於テハ屢々重症ノ貧血衰弱ヲ來スコト古來已ニ業ニ徴
知セシ所ノ者ニ之ヲ瓦工貧血 Niegearbeiter anaemie ト
稱セリ此貧血モ千八百八十三年メンヘ氏初メアポーンニ
於テ本虫ニ因スルヲ發見シ后チライヒテンステルン氏ハ
Reichtenstein コルンノ近傍ニ於テ之ヲ檢セリ
本邦ニ於テモ古來ヨリ一種原因不明ノ貧血病者アリシモ