

爲メ收棺時ニ於テ損傷セルモノナラン

第九項、其四(ハニロ)其六(ニ)ノ末段及ヒ其拾壹(ハ)ノ所

見ニ據レバ死体ノ年齢ハ大約拾四五才ナルベシト認ム

第十項、其參其五ノ前段其六(イ)中前頭骨及ヒ齒牙表面

ノ少ク炭化セルコト及ヒ其拾貳(ロ)(ハ)等ノ所見ニ據レ

ハ死后稍ヤ強度ノ火力ニヨリ燒爛セラレタルモノト認

ム

第五 鑑 定

以上説明セハ理由ニ據リ

一被害者ハ其年齢大約拾四五才ノ男子ニシテ細長銳利ノ

刃器ヲ以テ前頸部ヲ刺傷セラレ而シテ致命后、面皮剝殺、

胸腹四肢等ノ乱雜ナル切割及ヒ火力ニヨリ燒爛セラレ

タルモノト認ム

二死后經過ノ時間ハ分明ナラザルモ大約四五日間許ナラ

ント推測ス

右及鑑定候也

佐倉濟生病院外科手術

第四回報告 (承前)

醫學士 濱 野 昇 述

宮 崎 廉 調 査

千葉縣印旛郡野原村酒直

農業 荒井熊造妻スエ

六十年

血族中遺傳病ヲ存セス兄弟三人アリテ皆健在ス患者ハ輒
ヲソノ第三子ナリ稟賦強健ニシテ曾テ特ニ記スヘキノ疾
病ニ罹リシコトナシ齡十七ノ春始メテ月華破綻ス廿一歳ニ
シテ華爛ノ典ヲ舉グ一男一女ハ健存シ一男五女ハ六ヶ月
乃至八ヶ月ニシテ早産又ハ流産セリ四十九歳ノ頃ヨリ左
下腹部ニ鳩卵大ノ硬結物ヲ觸知ス運動ノ際時々微痛ヲ發
シ平時下腹部及ヒ腰部ニ寒冷ノ感覺ヲ存ス爾后硬結物ハ
漸次ニ發育増進シテ小兒頭大ニ達ス廿五年ノ頃ヨリ醫治
ヲ乞フ不治荏苒卅二年四月ニ至ル全月中旬ヨリ強度ノ便
秘ヲ發シ下劑ヲ服用セサレハ快通セス其際ヨリ尿ノ排泄

量大ニ減少シ腹部ハ漸々緊滿膨大シ次テ壓重呼吸困難働
作不能等ノ諸症ヲ起セシヲ以テ全年七月六日某醫ニ診療
ヲ乞ヒ穿刺シテ一萬二千瓦ノ液ヲ漏シ以後全醫ノ穿刺ヲ
行フ前後卅回ニシテ三十四萬六千四百瓦ノ液ヲ排セリ
ト謂フ上述ノ如ク醫治ヲ加フルト雖凡全治ノ目的ナキヲ
以テ卅三年三月十一日當院ニ來リ治療ヲ乞フ

体格中等ニシテ營養少ク不良ナル一老婦眼球結膜及ヒ口
唇ハ中等度ノ貧血ヲ呈シ皮膚ハ全般ニ乾燥シテ瘦削ニ陥
リ諸所ニ皺襞ヲ生シ皮下脂肪層モ亦頗ル減少シ筋肉大ニ
弛緩シ容貌憔悴トシテ一見病苦ニ耐ザルノ狀ヲ現セリ腹
部ハ一般ニ膨滿シ一皺襞ヲ止メテ呼吸困難言語窘迫食思
不振嘔氣胃部壓重ノ感覺等ノ諸症ヲ併發シ肺音ニ異狀ナ
ク心悸少ク元進ヲ仰臥ノ位置ニ於テ腹部ヲ診スルニ左右
均等ニ膨大シ波動明亮ニシテ打診音ハ正中部鼓音兩側部
ニ濁音ヲ呈ス觸診スルニ左下腹部ヨリ少ク正中線ヲ越テ
右側下腹部ニ亘レル一大腫瘍アリ
腹圍ハ臍上部ニ於テ八十四珊迷突

鈕狀突起ヨリ臍部ニ至ル二十珊迷突

臍部ヨリ耻骨縫際ニ至ル二十珊迷突ヲ算ス

十二日午前十時患婦ノ苦悶ヲ除キ診斷ノ確實ヲ計ルヲ目
的トシ左下腹部ヲ穿刺シテ九千六百六十瓦ノ液ヲ排泄セ
シメタリ此液ハ微灰白色ニシテ混濁シ蛋百質ヲ含有シ干
零十ノ比重ヲ有ス

爾後腹圍忽チ縮少シ弛緩シテ皺襞ヲ呈ス茲ニ於テ腹壁ヨ
リ腫瘍ヲ觸診スルニ少ク移動シ累々突起タル表面ヲ有シ
頗ル硬性ヲ有セリ

(機那皮四、〇煎一〇〇、〇稀鹽酸一、〇赤葡萄酒二〇、〇
ヌレタ水五、〇)一日三回分服

右ノ水劑ヲ投ジテ經過ヲ視察ス
診斷左方卵巢纖維樣囊腫ト診定ス

穿刺後一週日ヲ經テ腹部ハ再ヒ膨滿シ苦悶ハ舊ニ復シ呼
吸困難食思不振嘔氣等ノ諸症ヲ兼發スルヲ以テ患者切ニ
手術ヲ希望シテ止マズ

十八日午前九時開腹術ヲ施行ス

麻醉前穿刺シテ内容液九千三百瓦ヲ漏泄セシメ以テ手術ヲ容易ナムシム

麻醉消毒ハ方式ノ如シ臍下白線ニ沿ヒ層々皮膚ヲ切割シ耻骨縫際ノ上部ニ達ス長サ十七瓏迷突終リニ腹膜ヲ切開シテ創縁ヲ左右ニ展開シタリシニ創底乃チ腸管ノ外側ニ當リテ突冗緊々タル小兒頭大ノ硬腫瘍現出スネラトシ氏鉗子ヲ以テ之ヲ固鑷シ創外ニ牽出シ蒂莖ヲ探リテ二重結紮ヲ施シ之ヲ切斷シ斷面ニ沃度ホルム末ヲ撒布シ復納シテ腹壁ノ創縁ヲ縫合ス于時九時十分ナリ

クロ、ホルム一〇、〇カンフル十二箇ヲ注射セリ
重量千二百瓦之ヲ切割セシニ刀ハ憂々ノ聲ヲ發セリ
左卵巣纖維腫

千葉縣印旛郡富里村

農業 川島辰五郎妻カツ

二十八年

患者天資強壯十五歳ノ時眼病ヲ患ヒ右眼明ヲ失ス父ハ現存シ母ハ患者三歳ノ時死亡ス其因不明ナリ兄弟二人アリ

本患者ハ第二子ナリ血族中記ス可キ遺傳病ヲ存セス

十五歳ニシテ天裝初來ス廿一歳ニシテ嫁シ翌年女子ヲ分娩ス爾來月華整然トシテ乱レマ卅年二月ノ頃下腹部緊張シ次テ壓重ヲ覺エ精神不快ヲ感ゼシヲ以テ灸醫ニ治療ヲ乞フ彼ノ曰ハク是ハ之レ腹内ニ何物カ腫物ノ發生セシモノナラント然レハ患者ハ容易ニ其言ヲ信セズ他ニ診療ヲモ乞ハマシテ桂菴トシテ三十三年ニ及ブ全年八月頃ヨリ腹部ヲ第ニ膨滿緊張シ九月ニ至リテ次第ニ發育増大シ呼吸困難食思欠損胃部壓重等ノ感覺ヲ起シ又働靜ヲ問ハズ腹内ニ疼痛ヲ發シ兩便並ニ月花ニハ異狀ナシ腹内ニ異狀ナル一大腫瘍ノ存在セシヲ自覺セシハ八月初旬頃ナリト謂フ

体格中等營養稍佳良ノ一農婦皮下脂肪層ハ中等度ノ發育ヲ呈シ容姿憔悴シテ一見疾患ヲ病ムモノ、如シ腹部ハ緊滿膨大シ中央臍部頗ル前突セリ表面ハ滑澤ヲ呈スレハ敢テ皮下靜脈ヲ透視セズ唯數十ノ妊娠線様ノ經線ヲ視出セリ之ヲ觸診スルニ塊瘻様物ノ一ハ臍部ヨリ他ハ子宮底部

ヨリ甲へ左季肋部ニ乙へ臍部ニ達シテ發育セリ之ヲ壓スレバ移動ス右側卵巢ヨリ發生セシ一種ノ腫瘍ナラン内診スルニ子宮ニ於テハ異狀ヲ見ス

臍部 八十三珊迷

心窩 七十九珊迷

劍狀突起ヨリ耻骨縫合ニ至ル四十珊迷

抑々患婦ヲ初診セシハ九月五日ニシテ前記ノ腹圍ヲ算定

セシガ十月十八日入院ノ際少ク以前ヨリ膨大シタルヲ以テ改メテ之ヲ計測スルニ臍上部ニ於テノミハ十九珊迷ニ

増加シタリキ即チ前計ヨリ六珊迷ヲ増加シタリ翌十九日

先ヅ試ニ之ヲ穿刺シタルニ五千五百瓦ノ液体ヲ漏出セリ

此液異重一〇一五、

反症 中性

色 薑黄色微濁

蛋白質 バラアルブミン

不凝固 粘稠牽縷性

數十ノ膿汗様團塊物

其他腫瘍壁ノ退行變性シタル頰敗片無色顆粒様物ヲ鏡見セリ

十月廿八日午前七時廿分最壓消毒場内ニ於テ開腹術ヲ施行シ遺殘セル所ノ腹水ヲ徐々排却シチラトン氏鉗子ヲ以テ職瘍ヲ摘出セント欲シタリシニ其一部ヲ破壞シ内容液

約二百瓦ヲ漏セリ終ニ腸瘍ヲ剔出セリ于時全七時五十三

分是ニ於テ壁創ヲ縫合シテ技術ヲ完結ス

腹水殘留液二千五百瓦(計八千瓦余)

腹壁創ハ長サ二十五仙迷

腫瘍ハ多房性卵巢囊腫ニシテ右側ヨリ發生セシモノ全部

輸卵管モ共ニ切除セリ

腸間膜ノ一部及ヒ胃底ニ愈着アリキ

腫瘍ハ累々タル多囊一大團塊

重量二千瓦

追記(手術直前)

体温 三十七度

脈搏 八十至細少微弱

脈搏 八十至細少微弱

體重 十二貫五百目

千葉縣印旛郡成田町

染物業 和田勝造妻セキ

四十二年

父母現存シ兄弟二人アリ血族中遺傳病ヲ存セス患婦性來
 強健ニ歳ノ時天然痘ニ罹リシノ他曾テ記スベキノ疾患ヲ
 病ミシコナシ十七歳ニシテ月花破蕾シ毎月整然メリ二十
 四歳ニシテ嫁爛ノ典ヲ擧ク然レモ未ダ妊娠シタルコトナ
 シ今ヲ去ル六年前輒チ明治二十八年頃ヨリ左腸骨窩ノ稍
 上方ニ當リ桃實大ノ硬結物ノ存在スルヲ發見シ試ニ之ヲ
 押壓スルトキハ少シク上下ニ移動シタリ爾後漸次ニ發育
 シ全部季肋部ヨリ胃ノ底面ニ接シ臍部ニ於テ絞挫シテ右
 方腸骨窩ニ達セリ而シテ腫脹ハ益硬度ヲ増加セリ當時之
 ヲ壓スレモ移動セス腹壁ヲ外氣ニ暴露スル際ハ腫瘍内ニ
 於テ微痛ヲ發ス腹部ハ從テ緊滿シ大便ハ時々秘結スレモ
 尿ノ利通ニ異狀ナシ呼吸ニモ障害ナシ之ニ反シテ働作頗
 ル困難ヲ生セシヲ以テ當院ニ來リ入院治療ヲ乞フ

体格營養共ニ中等ノ一患婦皮膚ハ少シク彈力ヲ失ヒ筋肉

ハ中等度ノ發育ヲ呈シ顔面各所ニ痘痕ヲ存セリ心肺境ニ

異狀ナシ心悸動少シク元進セリ

体温 三十七度

脈搏 七十三至

最大腹圍八十五瓏迷

劍尖突起ヨリ臍部ニ至ル十六瓏迷

明治三十三年五月六日整規消毒ノ場裏内ニ剖腹術ヲ施行

ス于時午前七時全七時十五分手術ヲ結了ス性來酒好者ナ

ルヲ以テクロールホルム二十五瓦ヲ用ヒシライ氏液一筒

ヲ注射セリ

腫瘍ハ頗ル硬固ニシテ近隣器臟ニ愈着シ之ヲ剔出スル

能ハス直ニ腹壁創ヲ縫合セリ

聽ク所ニ據ラハ三十四年今日ニ至ルモ依然生存セリト云

フ然レモ多少精神上ニ異狀アリテ昨今デハ時々狂燥狀ノ

動作アリト聽ク恐ラクハ慢性固疾ニシテ一旦手術セシモ

全癒セサル爲メ精神上異常ヲ呈スルモノナラン乎

印旛郡根郷村太田

農業 和田仙之助妻キヨ

三十九年

父ハ六十六歳母ハ七十三歳ニシテ死ス兄弟四人アリシガ皆前後シテ没セリ患婦ハ三歳ノ時天然痘ニ罹リテ爾後麻疹ヲ經過スルノ外近年ニ至ルマデ特ニ徴スベキ疾患ニ罹シヨナシ十五歳ノ春初經來潮シ十八歳ニシテ婚嫁シ一男二女ヲ擧ゲ妊娠分娩及ヒ産褥ノ經過ハ普通ナリキ血族中生殖器ノ疾患ニ罹リシモノアルヲ聞知セス

卅二年一月感冒ニ罹リ某醫ノ診病ニ因テ全治ス全四月ヨリ五月ニ至ルノ間痔疾ニ罹リテ全治ス全六月初旬ヨリ右側肋膜炎ニ罹リ某醫ニ治療ヲ乞フト雖モ治セズ荏苒トシテ卅四年四月ニ至ル全月初旬當院ニ來リ診ヲ乞ヒ其際卵巢ノ疾患ヲモ共診センコト乞ヘリ

卅二年四月ノ頃患婦手ヲ以テ左臍窩ノ近傍ヲ按ゼシニ内ニ腫瘤様塊アリテ之ニ觸ルモノ感ヲ生ジタルヲ以テ直ニ腹部ヲ觀察セシニ果シテ左側ニ片在シテ腹部ノ少ク膨

隆セルヲ發見セリ而シテ該部漸次發育シテ右方ニ波及スルノ外觀ヲ呈ス從ツテ全下腹部ニ壓重緊滿ノ感覺ヲ生ズレドモ曾テ疼痛ヲ發セシヨナシ卅三年ノ春ニ至リ腫瘤漸次増育シ尿意頻數一日七八回ニ達シ全時ニ腫瘤部ニ於テ間歇的ニ疼痛ヲ發スルニ至ル而シテ精神憂鬱、身體違和、食思不振、動作不能等ノ諸症ヲ併發セリ

五月廿二日試穿刺術ヲ施シ赤褐色粘稠牽縷性ニシテ千零二十ノ比重ヲ有シ中性ノ反應ヲ呈スル液七百瓦ヲ漏泄シテ腹部ノ膨隆ハ全ク消滅ニ歸セリ

体格中等營養少ク不良ノ一婦人顔貌少ク羸瘦シ皮膚ハ弛緩シ筋肉ハ中等度ノ發育ヲ呈シ皮下脂肪層モ亦然リ肺心鏡ニ異狀ナク心悸少ク亢進セリ

体温三十六度八分、脈搏七十五至、体重九貫六百匁、右助膜炎及ヒ慢性氣管支炎ヲ存シタリ

全廿七日午前七時正規消毒法ヲ施行シ手術ヲ開始シ全七時廿三分手術ヲ結了スグロ、ホルム十瓦シライヒ氏液第二法ニ筒注射

左卵巢囊腫ニシテ單房性ノモノ小兒頭大ニシテ内ニ前記ノ液二百瓦ヲ存セリ

腹部切割ノ以前穿刺シタル爲腫瘤ハ縮少シテ腸管ノ内裏ニ退伏シ大ニ手術ヲ困難ナラシメタリ

患婦ハ術后二十五日ニシテ全治退院シ爾後身体益々健壯日々農業ニ從事セリト聽ク

葛生某三十歳ノ婦人血族中遺傳疾患ヲ存セス父母現存ス患婦性來健全ニシテ曾テ記スヘキ疾病ニ罹リシヲナシ十

四歳ニシテ月華破綻シ十七歳ニシテ婚嫁シ十九歳ノ時長子ヲ二十五歳ノ時次子ヲ擧ク爾後二十九歳ニ至リ妊娠シ

四ヶ月ニ至リ腹部ヲ打撲シ爲ニ流産セリ其後乃チ三十二年五月十五日ノ頃ヨリ腹部漸次膨大ス然レモ月華整調時

々腹部ニ攣縮疼痛及ヒ腰部ニ壓痛ヲ感スルノ他ニ異狀ナシ三十三年七月六日入院ス

体格營養共ニ中等ノ一婦人腹部膨滿シ殊ニ左側腸骨窩ニ於テ小兒頭大ノ柔軟ナル一腫瘍ヲ觸知シ微ニ搏動ス全年

全月十日穿腹術ヲ試シニ排泄液二千五百瓦ヲ得タリ此液

ハ淡黃色透明ニシテ弱亞兒加里性ノ反應ヲ呈シ一〇二〇、〇ノ比重ヲ有シ煮沸セシニ白色ノ沈澱ヲ生セリ

卵巢囊腫ノ疑診ヲ以テ姑息的穿腹術ノ如キハ到底根治療法ニアラス寧ロ斷然剖腹術ヲ行ヒ其病源ヲ明ニスルノ他

ニ治癒的療法ノアラサルヲ患婦ニ説諭シタルニ患婦ハ直ニ手術ノ施行ヲ希望ス

全月二十日嚴密ナル防腐消毒ノ下ニ肚腹切開術ヲ施セシニ豈ニ計ラシヤ卵巢ニハ少シモ異狀ナク最初前記ノ液五

千瓦ヲ漏泄シ囊腫ト疑診セシ左側ノ腫瘤ハ血液ノ凝固セシモノナリ是ニ於テ手ヲ腹腔ニ送入シ之ヲ除去セシニ全

量三千瓦ヲ得タリ〇六%ノ食鹽水ヲ以テ腹腔ヲ清洗シ腹膜ヲ檢セシニ頗ル肥厚シ一、五仙迷突ニ達セリ直ニ腹創

ヲ縫合シ手術ヲ完了ス術後腹痛攣縮腰部壓痛等ノ諸症狀全ク去リ腹水モ從テ全治シ八月七日退院ヲ命セリ

既往症ノ記載ニ因レハ妊娠中腹部ニ打撲ヲ蒙リ爲ニ該内

部ノ小血管ノ破綻ヲ來シ血腫ヲ生シ其慢性刺戟ニ因ル慢性局部的腹膜炎ノ結果腹水ヲ顯發セシモノナラン乎